

**Οδηγίες Χρήσης για να συμπεριληφθούν ή να προσαρτηθούν στο προϊόν όπως συνηθίζεται από την Cosmetics Europe.**

Το τεστ προειδοποίησης αλλεργίας πρέπει να πραγματοποιείται 48 ώρες πριν από κάθε εφαρμογή του προϊόντος, ακόμα και στην περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε βαφή μαλλιών στο παρελθόν.

Τι χρειάζεστε για να ετοιμάσετε το μίγμα\*: *μπατονέτα, καθαρά μαντηλάκια, μπολ βαφής (μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα)\**

Προετοιμάστε το μίγμα: με τη βοήθεια μίας μπατονέτας, ανακατέψτε σε ένα μπολ βαφής\* μία μικρή ποσότητα του προϊόντος 1 (βαφή) και του προϊόντος 2 (οξυζενέ ή οξειδωτικού ή οξειδωτικής κρέμας / developer) \* στην ίδια ποσότητα.

Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα. Σφραγίστε ξανά προσεκτικά τις συσκευασίες της βαφής και του οξυζενέ ή οξειδωτικού ή οξειδωτικής κρέμας\* (developer).

Εφαρμόστε ομοιόμορφα, με τη βοήθεια της μπατονέτας, μία λεπτή στρώση του μίγματος, ποσότητας σε μέγεθος μπιζελιού, πάνω σε μία περιοχή διαστάσεων 2x2 cm (εκατοστά) στην εσωτερική πλευρά του βραχίονά σας.

Αφήστε το μίγμα για 45 λεπτά, χωρίς να το καλύψετε ή να το ακουμπήσετε; αποφύγετε την επαφή με ρούχα· μετά από 45 λεπτά, ξεπλύνετε την περιοχή που κάνατε το τεστ με νερό, και στεγνώστε με ένα καθαρό πανάκι, ταμποναριστά.

Εάν εσείς ή ο/η πελάτης/ πελάτισσα σας παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλαγή/ αντίδραση στην επιδερμίδα, όπως φαγούρα, ερυθρότητα, πρήξιμο πάνω ή γύρω από την περιοχή που πραγματοποιήσατε το τεστ, κατά τη διάρκεια του τεστ, ή μέσα στις επόμενες 48 ώρες, εσείς ή ο/η πελάτης/ πελάτισσα σας θα πρέπει να ξεπλύνετε άμεσα τη περιοχή, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το προϊόν και θα πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό. Αυτό το τεστ αποτελεί ένα προληπτικό μέτρο, το οποίο έχει αποδειχθεί να είναι αξιόπιστο όταν πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται. Ωστόσο, ακόμα και αν έχετε πραγματοποιήσει το τεστ προειδοποίησης αλλεργίας, μπορεί να υπάρξει αλλεργική αντίδραση όταν βάψετε τα μαλλιά σας. Το τεστ προειδοποίησης αλλεργίας δεν αποτελεί εγγύηση για την αποφυγή μελλοντικών αλλεργικών αντιδράσεων. Αν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, αμφιβολία ή ερώτηση παρακαλείστε να συμβουλευτείτε γιατρό.

*\*η διατύπωση υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα με τα προϊόντα/αντικείμενα που παρέχονται από τον κατασκευαστή, τα ονόματα που τους έδωσε ο κατασκευαστής ή/και τους συγκεκριμένους τύπους προϊόντων που πρόκειται να δοκιμαστούν, π.χ. σκόνες, έτοιμο προς χρήση σκεύασμα, κλπ.*

